



Valmax I II

Ojos Rojos

TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO 0,5 mg/ml

COLIRIO

Venta Libre



Industria Argentina



Lea cuidadosamente esta información antes de usar el medicamento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar a su médico o farmacéutico. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre son graves o si aprecia cualquier efecto no deseado no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

QUE CONTIENE VALMAX OJOS ROJOS:

Cada 100 ml de colirio contiene:

Tetrahidrozolona Clorhidrato 0,050 gr.

Excipientes: Ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de benzalconio, agua para inyectables c.s.

Acción Terapéutica: DESCONGESTIVO OCULAR.

PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO:

Indicado para el alivio temporario del malestar y el enrojecimiento, debido a irritaciones oculares leves, las cuales pueden ser debidas por ejemplo al humo, al polvo, al agua clorada, a la luz (solar, rayos ultravioletas, neón, televisión), a las corrientes de aire, a los cosméticos, a las lentes de contacto, etc.

EN QUE CASOS NO SE PUEDE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

Hipersensibilidad (alergia) a alguno de los componentes del producto (ver composición).

Si padece de glaucoma o conjuntivitis.

Si usted padece hipertensión arterial, enfermedades del corazón, diabetes y/o hipertiroidismo debe consultar a su médico antes de utilizar este producto.

El producto no debe utilizarse en menores de 12 años, salvo indicación médica

QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE APLICARME ESTE MEDICAMENTO

Embarazo y lactancia: Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de tomar éste medicamento.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento si:

- Tiene alguna enfermedad del corazón grave
- Tiene un tumor en las glándulas adrenales (Feocromocitoma)
- Tiene alguna enfermedad de tiroides (Hipertiroidismo)
- Tiene niveles de azúcar en sangre elevados (Diabetes Mellitus)
- Tiene la tensión arterial alta (Hipertensión)

La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos, puede aumentar el enrojecimiento ocular.

QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO:

Sólo para uso externo.

Si se presenta dolor a nivel ocular, cambios súbitos en la visión; aparición de manchas tipo "moscas" en el campo visual; incremento de irritación o si la afección persiste luego de 24 horas de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

Importante: no utilizar el producto si el envase se encuentra abierto, roto o deteriorado.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Consulte a su farmacéutico o médico si tiene dudas.

Adultos: 1 a 2 gotas en cada ojo afectado, hasta cuatro veces al día.

El efecto descongestivo aparece inmediatamente luego de la aplicación de las gotas y se mantiene de 4 a 6 horas.





Modo de administración:

Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento:
Con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, separar los párpados, dirigir la vista hacia arriba y colocar una gota dentro del párpado inferior, dirigiendo enseguida la vista hacia abajo. Mantener abierto el o los ojos tratados, sin parpadear, durante 30 segundos. Si fuese necesario, aplicar de igual forma la segunda gota. Luego parpadear normalmente.

El orificio del frasco gotero no debe tocar el ojo ni tocarse con los dedos.
Si utiliza lentes de contacto debe quitárselos antes de la aplicación del producto y luego de quince minutos puede volver a colocarlos.

Después de cada aplicación cierre correctamente el envase.
Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.
Descartar después de un mes de abierto.

SI LOS SINTOMAS DE DISCONFORT O ENROJECIMIENTO PERSISTEN POR MAS DE 24 HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MEDICO

QUE REACCIONES ADVERSAS PUEDE PRODUCIR ESTE MEDICAMENTO:

Producir picazón o ardor ocular. Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. En estos casos se deberá suspender el tratamiento. Este producto puede aumentar la presión ocular.

QUE INTERACCIONES PUEDE TENER ESTE MEDICAMENTO CON OTROS MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS:

Este producto puede interactuar con antidepresivos (IMAO).
Si está medicado por hipertensión arterial, diabetes u otra enfermedad crónica, consulte a su médico antes de usar este producto, dado que puede interactuar con los medicamentos que usted está tomando.

QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, SI UTILICE MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA, O SI INGERÍ EL PRODUCTO:

Llame por teléfono a un centro de toxicología, o vaya al lugar mas cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:
· Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
· Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777 / 0800-333-0160

MODO DE CONSERVACIÓN:

Almacenar a una temperatura desde 15°C hasta 30°C.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?:

Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorios Valmax, por teléfono al 4621-1960/6910, o vía e-mail, info@valmax.com.ar. O en forma alternativa, con ANMAT Responde, 0800-333-1234.

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero conteniendo 10 o 15 ml.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: Noviembre 2016.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 58.193

IBA000087

Laboratorios Valmax S.A.

Director Técnico: Eduardo D. Rodríguez, Farmacéutico.

Suboficial Perdomo 1619, Ituzaingó (1714), Pcia. de Buenos Aires.

Tel/Fax: (5411) 4621-1960 / 6910 - info@valmax.com.ar

 **Valmax**

