



Valmax Lágrimas

HPMC 0,3%•DEXTRAN 70 0,1%
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL



Venta Libre

Industria Argentina

Composición:

Cada 100 ml de solución Oftálmica Estéril contiene:

Hidroxipropilmetilcelulosa	0,30 gr
Dextran 70	0,10 gr
Cloruro de Potasio	0,12 gr
Cloruro de Sodio	0,77 gr
Edetato Disódico Dihidrato	0,05 gr
Cloruro de Benzalconio	0,01 gr
Ácido Clorhídrico c.s.p.	pH
Agua Purificada c.s.p.	100 ml

Lea cuidadosamente esta información antes de usar el medicamento

Este medicamento puede adquirirse sin receta.
No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar a su médico o farmacéutico. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre son graves o si aprecia cualquier efecto no deseado no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Acción Terapéutica: LUBRICANTE OCULAR.

¿Para qué se usa este medicamento?

Valmax Lágrimas se utiliza para el alivio de los síntomas de sequedad ocular.

¿En qué casos no se puede utilizar este medicamento?

Hipersensibilidad (alergia) a alguno de los componentes de la formulación.

¿Qué cuidados debo tener antes de aplicarme este medicamento?

Embarazo y lactancia: si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de utilizar Valmax Lágrimas.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?

En el caso de experimentar dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o irritación ocular continua, o si estos síntomas empeoran o persisten durante más de 72 horas, suspender el uso de esta medicación y consultar de inmediato al médico oftalmólogo.

Este producto, por contener cloruro de benzalconio como excipiente puede decolorar las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar de 10 a 15 minutos antes de volver a colocarse las lentes.

Tapar después de usar, para evitar contaminaciones, y que la punta del envase gotero toque cualquier superficie. Conducción y uso de máquinas: No se han descrito efectos secundarios sobre la capacidad de conducción o utilización de maquinarios por el uso de Valmax Lágrimas.

¿Cómo usar este medicamento?

Instilar una o dos gotas en cada ojo, tantas veces como sea necesario. Se aconseja que en el caso de que se utilicen lentes de contacto blandos, estos deben ser retirados antes de la instilación del producto, pudiendo colocárselos nuevamente transcurridos 10 o 15 minutos.

Utilizar el producto previa limpieza de manos, evitando que el gotero tome contacto con cualquier superficie.

Antes de usar otras medicaciones oftálmicas, esperar como mínimo 5 minutos.

En el caso de experimentar dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o irritación ocular continua, o si estos síntomas empeoran o persisten durante más de 72 horas, suspender el uso de esta medicación y consultar al médico oftalmólogo.





¿Qué reacciones adversas puede producir este medicamento?

Ocasionalmente puede producirse sensación leve y transitoria de quemazón o picazón y muy raras veces reacciones de irritación o hipersensibilidad.

Si se observa cualquier reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

¿Qué interacciones puede tener este medicamento con otros medicamentos y sustancias?

No se han observado interacciones con otros medicamentos y Valmax Lágrimas.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si instilo más cantidad de la necesaria?

Debido a las características de este preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En caso de sobredosis o ingestión accidental, comuníquese a su centro de toxicología, o concorra al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 011 4962 6666 / 2247

- Hospital A. Posadas: 011 4654 6648 / 4658 7777 / 0800 333 0160

Modo de Conservación: Almacenar a una temperatura desde 15°C hasta 30°C.

¿Tiene usted alguna pregunta?. Ante cualquier duda comuníquese con Laboratorios Valmax, por teléfono al

011 4621 1960 / 6910 o vía e-mail, info@valmax.com.ar o en forma alternativa, con ANMAT Responde, 0800 333 1234

Presentación Valmax Lágrimas: Envase gotero conteniendo 15 ml.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 57776

IBA 000076-01

Laboratorios Valmax S.A.

Director Técnico: Eduardo D. Rodríguez – Farmacéutico.

Suboficial Perdono 1619, Ituzaingó (1714), Pcia. de Buenos Aires.

Tel/Fax: (5411) 4621-1960 / 6910 – info@valmax.com.ar

 **Valmax**

