



Valmexina[®] VL Pediátrico

BROMHEXINA CLORHIDRATO - JARABE
Venta Libre Industria Argentina



Fórmula:

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Clorhidrato de Bromhexina:	80 mg
Ácido cítrico monohidrato:	60 mg
Benzoato de sodio:	3,3 mg
Carboximetilcelulosa sódica:	25 mg
Sabor artificial a cereza:	0,4 ml
Glicerina:	15 ml
Sorbitol al 70 %:	15 ml
Propilenglicol:	20 ml
Solución de rojo punzó 4R	1ml
Agua purificada c.s.p.:	100 ml

Lea detenidamente esta información antes de tomar o administrar este medicamento.

¿Qué es VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO?

Expectorante, mucolítico.

¿CÓMO ACTÚA VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO?

Es un agente mucolítico, fluidificador de las secreciones bronquiales.

¿Para qué se utiliza VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO?

Alivio sintomático del catarro bronquial y la tos (por fluidificación), facilitando su expectoración.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar o administrar VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO?

Tenga especial cuidado:





- En pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal.
- En caso de administración a niños pequeños, puede observarse un aumento de las secreciones durante el tratamiento.
- En caso de administración junto con ciertos antibióticos (Ej: Amoxicilina, Cefuroxima, Eritromicina, Doxiciclina).
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico de inmediato
- En caso de administración junto con broncodilatadores (Ej: Salbutamol).

Conserve este prospecto, ya que puede tener que leerlo nuevamente.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando o administrando VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO?

Posibles efectos adversos.

Se pueden presentar molestias gástricas: náuseas, vómitos, reacciones alérgicas leves (rash cutáneo - urticaria), broncoespasmos.



SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO. "NO ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 5 DÍAS."

¿Qué personas no pueden recibir VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento.

- En caso de alergia a alguno de sus componentes.
- En niños menores de 2 años.

CÓMO USAR VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO.

VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO no debe ser administrado a los niños menores de 2 años. Como orientación se señalan las siguientes dosis terapéuticas habituales:

- Niños de 2 a 6 años: 2,5 ml cada 8 horas.
- Niños de 6 a 12 años: 5 ml, cada 8 horas.

Este producto se ha diseñado específicamente para usar sólo con la medida dosificadora que lo acompaña.

Para administrar 5 ml de VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO, llenar la medida dosificadora hasta la segunda marca con el indicador de 5 ml.

Para administrar 2,5 ml de VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO, completar la medida dosificadora hasta la primera marca con el indicador de 2,5 ml.

¿Qué debo hacer ante un sobredosis?

Concurrir al Centro asistencial más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

HOSPITAL PEDRO DE ELIZALDE (EX CASA CUNA): (011) 4300-2115.

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLOGICA LA PLATA (0221) 451-5555.

ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.

Conservación de VALMEXINA VL JARABE PEDIÁTRICO.

Conservar en su envase original a temperatura ambiente hasta 30°C y al abrigo de la luz.

NO DEBE UTILIZARSE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE. MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 1, 25 y 50 frascos de 100 mililitros, con una medida dosificadora, siendo las dos últimas presentaciones para uso hospitalario exclusivo

Director Técnico: Eduardo D. Rodríguez – Farmacéutico

Elaborado por: Laboratorios Valmax S.A.

Planta Industrial y Administración: Suboficial Perdomo 1619, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires • Argentina

Teléfono: 54 11 4621-1960

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 57622

Fecha de última revisión: Febrero de 2015

IBA000042-01

 **Valmax**